

LA VACCINAZIONE

Vaccino anti-meningococco ACWY

prevede una dose singola.

Nella Regione Veneto è offerto gratuitamente con chiamata attiva:

- **a tutti i nuovi nati al 13° mese di vita;**
- **agli adolescenti al 14° anno di età.**

La gratuità è garantita fino ai 18 anni e per soggetti affetti da determinate patologie.

Vaccino anti-meningococco B

Il numero di dosi necessarie varia in base all'età di inizio del ciclo vaccinale, secondo quanto previsto dal calendario vaccinale.

In Veneto, la vaccinazione è offerta gratuitamente con chiamata attiva:

- **a tutti i nuovi nati, a partire dal 3° mese di vita**
- **agli adolescenti nel 14° anno di età**

La gratuità è garantita fino ai 18 anni e per soggetti affetti da determinate patologie.



Per maggiori informazioni
inquadra il QR code
per collegarti al sito
ULSS 7 Pedemontana

ED.03/2026

SEDI VACCINALI

DISTRETTO 1

BASSANO DEL GRAPPA

Tel 0424885556

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30

Email: asv.bassano@aulss7.veneto.it

sede vaccinale: BASSANO DEL GRAPPA
via Cereria, 15

ROSÀ

Tel 0424885556

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30

Email: asv.rosa@aulss7.veneto.it

sede vaccinale: ROSÀ via dei Dogi, 24

MAROSTICA

Tel 0424885556

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30

Email: asv.marostica@aulss7.veneto.it

sede vaccinale: MAROSTICA via Panica, 17

ASIAGO

Tel 0424885556

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30

Email: asv.asiago@aulss7.veneto.it

sede vaccinali : ASIAGO via Monte Sisemol, 2
ENEGO via L. Cappellari, 59

DISTRETTO 2

THIENE

Tel 0445388976

dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle 12.30

Email: vaccinazioni.thiene@aulss7.veneto.it

sede vaccinale: THIENE via Boldrini 1 - Piano 1

SCHIO

Tel 0445598200

dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle 12.30

Email: vaccinazioni.schio@aulss7.veneto.it

sede vaccinale: SCHIO via De Lellis,1, Piano 1.



MENINGITE DA MENINGOCOCCO CEPPI A-C-W-Y B


LA MALATTIA

COS'È IL MENINGOCOCCO

Il meningococco è tra gli agenti batterici che possono causare meningiti.

Si trova, frequentemente in gola e nel naso, dove di solito non dà nessun problema.

Esistono diversi sierotipi di questo germe, i più diffusi sono A - B - C - Y - W135.



COME SI TRASMETTE

L'infezione può essere trasmessa attraverso il contatto diretto con persone infette (es. starnuti, colpi di tosse, saliva).


CHI E' PIÙ A RISCHIO

L'incidenza più elevata si verifica nei bambini piccoli, con un secondo picco di malattia tra adolescenti e giovani adulti.

COSA CAUSA

I batteri si possono diffondere attraverso il sangue dando luogo a meningiti (infiammazione delle membrane che avvolgono il cervello) o sepsi (infezione diffusa nel sangue).

Queste malattie sono sempre gravi e, anche se trattate precocemente, possono lasciare danni permanenti.



DANNI CEREBRALI



PERDITA DI ARTI



SORDITA'

La malattia ha spesso una rapida progressione, con un tasso di mortalità dell'8-15%.

Perché vaccinarsi?

La meningite meningococcica può avere un decorso rapido e potenzialmente fatale. Anche nei casi guariti possono verificarsi complicanze gravi e permanenti.

Vaccinarsi significa proteggere sé stessi e contribuire alla tutela della comunità.

EFFETTI COLLATERALI POST VACCINAZIONE



Possibile comparsa di dolore, gonfiore, rossore (di solito lievi e di breve durata)



Possibile rialzo febbrile, lieve irritabilità o sonnolenza e malessere



Come qualsiasi altra sostanza estranea nell'organismo, i vaccini possono determinare, molto raramente, reazioni allergiche. Per tale motivo, dopo la vaccinazione si attendono 15 minuti in sala d'attesa.

COSA FARE DOPO LA VACCINAZIONE ?

In caso di febbre è possibile utilizzare paracetamolo.

Un lieve gonfiore nel punto di iniezione può persistere per alcune settimane, ma non è pericoloso e non richiede trattamento. E' possibile applicare impacchi freddi localmente senza massaggiare.