

Come prendere appuntamento?

L'appuntamento per la vaccinazione può essere preso presso le seguenti sedi del Servizio Vaccinale:

ASIAGO

via Monte Sisemol, 2 tel. 0424 885556 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30

asv.asiago@aulss7.veneto.it

BASSANO DEL GRAPPA

via Cereria, 15 - tel. 0424 885556 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30

asv.bassano@aulss7.veneto.it

MAROSTICA

Via Panica, 17 - tel. 0424 885556 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30

asv.marostica@aulss7.veneto.it

ROSA'

Via Lepanto, 1 – tel. 0424 885556 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30

asv.rosa@aulss7.veneto.it

SCHIO

Via San Camillo De Lellis, 1 - tel. 0445 598200 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

vaccinazioni.schio@aulss7.veneto.it

THIENE

Via Boldrini, 1 - tel. 0445 388976 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

vaccinazioni.thiene@aulss7.veneto.it

**Le vaccinazioni contro
la pertosse e l'influenza
sono gratuite per tutte
le donne in gravidanza**

Per informazioni:

Ulls 7 Pedemontana

<https://www.aulss7.veneto.it/vaccinazioni-raccomandate-per-le-donne-in-eta-fertile-e-in-gravidanza>



Ministero della Salute

<http://www.salute.gov.it/portale/home.html>

Servizi Ospedalieri di
Ostetricia-Ginecologia e Pediatria
Consultorio Familiare
Dipartimento di Prevenzione -
Servizio di Igiene e Sanita`
Pubblica

**MAMMA,
proteggi i tuoi
bambini**



**La vaccinazione contro
PERTOSSE e INFLUENZA
in gravidanza**

Pertosse

Quanto è pericolosa per i bambini piccoli?

La pertosse è una malattia infettiva molto contagiosa causata da un batterio (*Bordetella pertussis*), particolarmente grave nel 1° anno di vita.

Si trasmette con starnuti, tosse o semplicemente parlando. Negli adulti e negli adolescenti i sintomi sono più lievi, per questo possono infettare molto più facilmente i neonati che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario. Nel neonato e nel lattante spesso si manifesta con accessi di tosse e crisi di soffocamento, che costringono al ricovero in ospedale. Nei casi più gravi può causare danni permanenti o la morte del bambino.

Come proteggersi?

In Italia, con la diffusione della vaccinazione, il numero dei casi di pertosse si è fortunatamente ridotto moltissimo, ma la malattia è ancora presente.

Chi ha avuto la malattia o è stato vaccinato è protetto solo per qualche anno, poi può nuovamente reinfeccarsi e contagiare gli altri.

Nei primi sei mesi di vita il bambino può essere protetto dagli anticorpi ricevuti dalla madre che viene vaccinata durante la gravidanza.

La vaccinazione è fortemente raccomandata a tutte le donne gravide e ad ogni gravidanza.

La vaccinazione contro la pertosse in gravidanza è sicura, come confermato da numerosi studi.

Quando fare la vaccinazione?

Il periodo migliore per la vaccinazione è tra la 27^a e la 36^a settimana di gestazione, idealmente intorno alla 28^a settimana.

Si utilizza una sola iniezione di vaccino che protegge anche contro difterite e tetano. Il vaccino viene somministrato per via intramuscolare, a livello della parte superiore del braccio, ed è sicuro sia per la mamma sia per il nascituro.

È, infatti, un vaccino inattivato che non contiene organismi vivi e che non può causare la pertosse. Gli effetti collaterali più comuni sono lievi e del tutto passeggeri, come: rossore, dolore, gonfiore nel punto dell'iniezione.

Influenza

Perché è importante vaccinarsi?

L'influenza non è una malattia banale né per la mamma né per il bambino piccolissimo. Contratta in gravidanza, può portare a complicazioni respiratorie serie e risultare addirittura fatale, specialmente durante il secondo e terzo trimestre e nel primo mese dopo il parto.

La vaccinazione antinfluenzale è l'unico strumento di prevenzione per proteggere i lattanti nei primi sei mesi di vita, quando è più alto il rischio di gravi complicanze in caso di malattia.

La vaccinazione materna passa loro preziosi anticorpi attraverso la placenta. Si può effettuare in qualsiasi fase della gestazione.

Dove fare le vaccinazioni?

Le vaccinazioni vengono effettuate presso tutti gli ambulatori vaccinali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ULSS 7 Pedemontana, su appuntamento. Il giorno della vaccinazione è necessario portare con sé la cartella della gravidanza.