



Contattaci!

Distretto 1:

Via Cereria, 15, 36061 Bassano del Grappa (VI)

 0424 885546

 asv.sisp@aulss7.veneto.it

Distretto 2:

Via Boldrini, 1, 36016 Thiene (VI)

 0445 388976
0445 598200
Dal Lun al Gio
dalle 09:00 alle 12:30

 vaccinazioni.thiene@aulss7.veneto.it
vaccinazioni.schio@aulss7.veneto.it

A CURA DEL

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

SERVIZIO IGIENE E
SANITÀ PUBBLICA



 REGIONE DEL VENETO

VIVO Piano Regionale
BENE Prevenzione del Veneto
VENETO

REGIONE DEL VENETO

 **ULSS7**
PEDEMONTANA

Edizione 01/2025
DGR n.990 del 11/08/2023

REGIONE DEL VENETO
 **ULSS7**
PEDEMONTANA

Soggetti con
asplenia
anatomica o
funzionale


Vaccinazioni
Raccomandate



La condizione di asplenia (anatomica o funzionale), espone maggiormente le persone ad un rischio di infezioni gravi.

Si consiglia l'esecuzione delle vaccinazioni almeno 14 giorni prima della splenectomia.

Se non è possibile, il percorso vaccinale dovrebbe essere iniziato 14 giorni dopo la splenectomia o comunque prima della dimissione.



PNEUMOCOCCO (PCV20 - PPSV23)

La vaccinazione previene il rischio di malattie invasive quali polmonite, sepsi e meningite.

Dosi previste: 1 dose di Pneumococco coniugato seguita da 1 dose di Pneumococco 23

MORBILLO - PAROTITE - ROSOLIA - VARICELLA (MPR-V)

La vaccinazione è raccomandata in soggetti che non siano immunodepressi e che non abbiano già contratto l'infezione naturale.

Dosi previste: ciclo di 2 dosi

MENINGOCOCCO (MEN B - MEN ACWY)

La vaccinazione previene il rischio di meningite e sepsi.

Dosi previste:

- Men ACWY: ciclo di 2 dosi
- Men B: ciclo di 2 o 3 dosi

ALTRE VACCINAZIONI

- **DIFTERITE - TETANO - PERTOSSE (DTP):** ciclo di base e richiamo ogni 10 anni
- **HAEMOPHILUS INFLUENZAE (Hib):** 1 dose
- **INFLUENZA:** 1 dose ogni anno
- **COVID-19:** secondo le raccomandazioni vigenti