



Contattaci!

Distretto 1:


Via Cereria, 15, 36061 Bassano del Grappa (VI)

 0424 885546

 asv.sisp@aulss7.veneto.it

Distretto 2:

Via Boldrini, 1, 36016 Thiene (VI)

 0445 388976
0445 598200
Dal Lun al Gio
dalle 09:00 alle 12:30

 vaccinazioni.thiene@aulss7.veneto.it
vaccinazioni.schio@aulss7.veneto.it

A CURA DEL

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

SERVIZIO IGIENE E
SANITÀ PUBBLICA



VIVO Piano
Regionale
BENE Prevenzione
del Veneto
VENETO

Edizione 09/2023
DGR n.990 del 11/08/2023

REGIONE DEL VENETO
 **ULSS7**
PEDEMONTANA

REGIONE DEL VENETO
 **ULSS7**
PEDEMONTANA


Soggetti con
trapianto di
cellule staminali
ematopoietiche
(HSCT)

Vaccinazioni
Raccomandate



I pazienti trapiantati sono ad alto rischio di sviluppare infezioni a causa delle terapie immunosoppressive che comportano una perdita dell'immunità precedentemente acquisita.

Sono fortemente raccomandate alcune vaccinazioni da ripetere, anche se già effettuate in passato, a partire da 6 mesi dopo il trapianto o dopo la terapia immunosoppressiva.



PNEUMOCOCCO (PCV20 - PPSV23)

La vaccinazione previene il rischio di malattie invasive quali polmonite, sepsi e meningite.

Dosi previste: 3 dosi di Pneumococco coniugato seguite da 1 dose di Pneumococco 23

HERPES ZOSTER RICOMBINANTE (HZr)

La vaccinazione previene il rischio di Herpes Zoster e di nevralgia post erpetica.

Dosi previste: ciclo di 2 dosi

MENINGOCOCCO (MEN B - MEN ACWY)

La vaccinazione previene il rischio di meningite e sepsi.

Dosi previste:

- Men ACWY: ciclo di 2 dosi
- Men B: ciclo di 2 o 3 dosi

MORBILLO - PAROTITE - ROSOLIA - VARICELLA (MPR-V)

La vaccinazione previene il rischio di contrarre la malattia. Può essere effettuata in soggetti suscettibili, asintomatici, senza grave immunosoppressione dopo 24 mesi dal trapianto.

Dosi previste: ciclo di 2 dosi

EPATITE B (HBV)

La vaccinazione previene la malattia e la sua evoluzione verso la cirrosi e il carcinoma epatico.

Dosi previste:

- HBV: ciclo di 3 dosi con successiva verifica della risposta immunitaria

ALTRE VACCINAZIONI

- **DIFTERITE - TETANO - PERTOSSE - POLIO (DTP-IPV):** ciclo di base e richiamo ogni 10 anni
- **INFLUENZA:** 1 dose ogni anno
- **PAPILLOMA VIRUS (HPV):** in base all'età e al rischio
- **COVID-19:** secondo le raccomandazioni vigenti

HAEMOPHILUS INFLUENZAE (Hib)

La vaccinazione previene il rischio di meningite e polmonite.

Dosi previste: ciclo di 3 dosi