




Contattaci!

Distretto 1:


Via Cereria, 15, 36061 Bassano del Grappa (VI)

 0424 885546

 asv.sisp@aulss7.veneto.it

Distretto 2:

Via Boldrini, 1, 36016 Thiene (VI)

 0445 388976
0445 598200
Dal Lun al Gio
dalle 09:00 alle 12:30

 vaccinazioni.thiene@aulss7.veneto.it
vaccinazioni.schio@aulss7.veneto.it

A CURA DEL

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

SERVIZIO IGIENE E
SANITÀ PUBBLICA



VIVO Piano
Regionale
BENE Prevenzione
del Veneto
VENETO

Edizione 09/2023
DGR n.990 del 11/08/2023

REGIONE DEL VENETO
 **ULSS7**
PEDEMONTANA

REGIONE DEL VENETO
 **ULSS7**
PEDEMONTANA

Soggetti con
insufficienza
renale
cronica e
sindrome
nefrosica

Vaccinazioni
Raccomandate





I soggetti affetti da patologia renale cronica sono maggiormente suscettibili alle patologie infettive e alle relative complicanze a causa della compromessa funzionalità del sistema immunitario.

L'efficacia è maggiore quanto più precocemente è avviato il percorso vaccinale.



PNEUMOCOCCO (PCV20 - PPSV23)

La vaccinazione previene il rischio di malattie invasive quali polmonite, sepsi e meningite.

Dosi previste: 1 dose di Pneumococco coniugato seguita da 1 dose di Pneumococco 23

HERPES ZOSTER RICOMBINANTE (HZr)

La vaccinazione previene il rischio di Herpes Zoster e di nevralgia post erpetica.

Dosi previste: ciclo di 2 dosi

MENINGOCOCCO (MEN B - MEN ACWY)

La vaccinazione previene il rischio di meningite e sepsi.

Dosi previste:

- Men ACWY: 1 dose
- Men B: ciclo di 2 o 3 dosi

EPATITE B (HBV)

La vaccinazione previene la malattia e la sua evoluzione verso la cirrosi e il carcinoma epatico.

Dosi previste: ciclo di 4 dosi e verifica sierologia

MORBILLO - PAROTITE - ROSOLIA - VARICELLA (MPR-V)

La vaccinazione previene il rischio di contrarre la malattia. Può essere effettuata in soggetti suscettibili, asintomatici, senza grave immunosoppressione.

Dosi previste: ciclo di 2 dosi

ALTRE VACCINAZIONI

- **DIFTERITE - TETANO - PERTOSSE (DTP):** ciclo di base e richiamo ogni 10 anni
- **INFLUENZA:** 1 dose ogni anno
- **COVID-19:** secondo le raccomandazioni vigenti