

NOTE INFORMATIVE PRE-INTERVENTO

ASPORTAZIONE DI CISTI OVARICA O ASPORTAZIONE DELLE OVAIE E TUBE (ANNESSIECTOMIA)

L'indicazione all'intervento è posta dalla presenza di una o più formazioni cistiche su una o entrambe le ovaie, con o senza sintomi: dolore, irregolarità mestruali, senso di peso addominale, talvolta anche difficoltà di digestione.

Le cisti vanno asportate se hanno caratteristiche sospette per malignità:

- presenza di parti solide (dure)
- vasi sanguigni molto visibili
- presenza di papille
- grandi dimensioni
- presenza di liquido in addome
- peggioramento nel tempo di queste caratteristiche.

Lo studio della cisti va eseguito con:

- ecografia pelvica transvaginale eseguita da un ginecologo
- dosaggio plasmatico del marcatore ca 125 in casi selezionati (prelievo di sangue)

Dalla valutazione di tutti questi parametri il ginecologo si orienta sui vari tipi di cisti:

- benigna
- endometriosa
- tumorale con vari gradi di malignità.

In base al tipo di cisti si definisce il tipo di intervento più adeguato:

- **asportazione della sola cisti:** nell'ipotesi che sia benigna, ma da asportare perché causa sintomi o è di dimensioni importanti.

Tecnicamente la cisti:

- viene enucleata, cioè tolta intera
- se di grandi dimensioni viene strizzata, cioè sgonfiata dal suo contenuto (liquido) e poi la parete della cisti viene asportata dal tessuto ovarico sano per essere analizzata

Gli interventi sulle ovaie, pur conservativi e meno invasivi possibile, ne possono causare una riduzione delle dimensioni, la cui entità verrà specificata nel verbale operatorio, e di conseguenza del proprio patrimonio follicolare, con possibili risvolti in termini di fertilità (osservazione valida soprattutto nel caso di cisti endometriosa)

- **asportazione anche dell'ovaio** che ospita la cisti se il tessuto ovarico buono e quello cistico non sono distinguibili o se la manipolazione chirurgica potrebbe causare la rottura della cisti
- **asportazione di entrambe le ovaie** e delle tube se una o entrambe le ovaie contengono cisti e la paziente ha più di 65 anni.

Questa opzione a volte viene consigliata anche a pazienti in menopausa o perimenopausa già operate per patologia maligna della mammella o con forte familiarità per patologia maligna mammaria e/o ovarica


Talora le dimensioni e le caratteristiche delle cisti ne determinano la **rotazione sul proprio asse**, generalmente provocando dolore acuto, per lo strozzamento dei vasi che irrorano l'ovaio. La de-rotazione e l'asportazione della cisti sono quasi sempre sufficienti a ripristinare la funzionalità dell'organo, solo in taluni casi si rende necessaria l'asportazione dell'ovaio intero in un secondo intervento.

L'intervento sarà con **accesso laparoscopico**, significa che il chirurgo ginecologo che lo esegue non taglia la pancia, ma ci entra attraverso 3 o 4 incisioni da 5 mm.

Esegue prima di tutto un'incisione da 5 mm alla base dell'ombelico, in questa sede introduce una telecamera (laparoscopia) che permette di analizzare tutti gli organi addominali, poi esegue altre due o tre incisioni nella parte bassa dell'addome attraverso le quali vengono introdotti in addome gli strumenti che permettono di lavorare all'interno di una pancia che resta chiusa.



L'addome viene poi gonfiato con del gas apposito in modo da sollevare la parete addominale e creare lo spazio che permette i gesti chirurgici.



Il ginecologo vede le immagini raccolte dalla telecamera su uno schermo davanti a se' dove gli **organi addominali vengono magnificati** cioè l'ingranditi e arricchiti di dettagli anatomici non visibili ad occhio nudo.

L'anestesia è sempre generale.

L'**obiettivo** da ottenere con questa tecnica chirurgica può essere estetico: piccole incisioni anziché tagli, ma **deve essere soprattutto funzionale**.

Avendo ridotto il trauma chirurgico a minuscole incisioni il dolore postoperatorio è minimo e la **ripresa delle normali funzioni** (funzione urinaria e intestinale) **deve essere molto veloce**.

La chirurgia laparoscopica viene infatti chiamata anche **“la chirurgia gentile”** perché permette un'ottima visione, e quindi permette di rispettare le strutture sane e utili come vasi sanguigni e piccoli filamenti nervosi che circondano le strutture malate da asportare.

Chirurgia “gentile o miniinvasiva” non significa facile, o parziale, anzi è un tipo di chirurgia molto complessa che esige uno sforzo ed un addestramento importanti e costante da parte del chirurgo, ma è **sempre la prima scelta dei chirurghi che lavorano in questo reparto**, per le irrinunciabili **ricadute positive sulla qualità della degenza e della convalescenza**.

Non significa nemmeno chirurgia priva di rischi o complicanze, che sono meno frequenti della chirurgia tradizionale, ma non assenti, e riassumibili nelle seguenti percentuali

Emorragia intra o post-operatoria (possibilità di emotrasfusione, conversione laparotomica = apertura dell'addome o reintervento)	Basso 1%
Perforazione uterina	Basso 1%

Lesione ureterale	Molto basso < 1%
Peritonite	Molto basso < 1%
Lesione vescicale	Molto basso < 1%
Lesione intestinale con peritonite	Molto basso < 1%
Lesione di un grosso vaso arterioso o venoso	Rarissimo < 1‰
Rischio anestesilogico	Rarissimo < 1‰
Riduzione severa della riserva ovarica (in caso di asportazione della cisti ovarica)	0,9-2,4%

Dopo che si sono raggiunte le condizioni operatorie descritte inizia l'intervento, che nel caso del trattamento di una cisti ovarica può essere in tre modalità:

1. Se la **cisti è di basso sospetto** (molto poco probabile che sia maligna) viene tolta con le modalità viste sopra e inviata per esame istologico con tempistiche normali.
2. Se la **cisti è di sospetto intermedio** (poco probabile che sia maligna, ma non escludibile) durante il colloquio preoperatorio il medico spiega che è possibile un trattamento in due tempi:
 - asportazione della sola cisti o dell'ovaio malato, e richiesta di esame istologico urgente. All'arrivo dell'esame istologico dopo circa 15 giorni circa la paziente viene ricontattata per stabilire il tipo e il tempo di eventuali altre terapie suggerite dall'esito istologico
3. Se la **cisti è di alto sospetto** (molto probabilmente maligna) viene programmato un intervento che comprende
 - laparoscopia diagnostica e asportazione delle lesione principale se possibile, altrimenti saranno eseguite delle biopsie sulle lesioni visibili e sarà inviato un esame istologico con tempistiche urgenti. Sarà inoltre valutato il tipo di malattia e la sua diffusione in addome. Dopo circa 15 giorni dall'intervento, all'arrivo dell'esame istologico e dopo discussione multidisciplinare del caso, la paziente verrà convocata per la prosecuzione delle cure chirurgiche (secondo intervento) o mediche (chemioterapia preoperatoria neoadiuvante).
 - asportazione della cisti sempre in laparoscopia o anche in laparotomia (apertura della pancia dallo sterno al pube)

Alcune note organizzative sull'intervento:

Dopo la prenotazione verrà contattata per fare tutti gli esami preoperatori, e la compilazione della cartella clinica e del consenso informato sia con il ginecologo che con l'anestesista.

Il ricovero sarà la mattina stessa dell'intervento. L'orario al quale deve arrivare in reparto, le sarà comunicato telefonicamente il giorno prima.

A distanza di poche ore dalla fine dall'intervento (dipendentemente dal tipo e durata dell'intervento subito) sarà invitata dalle infermiere di reparto a sedersi sul letto, poi a scendere e recarsi al bagno, se non avrà nausea o vomito potrà iniziare a bere e poi ad alimentarsi, la notte non avrà bisogno di assistenza (salvo casi eccezionali da concordare con il personale infermieristico).

Se la cisti è di basso sospetto verrà dimessa la sera stessa del ricovero o la mattina successiva. Se l'intervento è più complesso starà ricoverata due o tre giorni, se c'è stata apertura dell'addome fino a 8 giorni, o fino a quanto starà bene.

L'orario di dimissione varia anche in base a possibili concomitanti emergenze/urgenze di reparto.

A casa è invitata a riprendere da subito una vita normale, potrà fare la doccia da subito e non dovrà tornare in reparto per la rimozione dei punti di sutura. Alla dimissione le verranno ripetute e scritte tutte le informazioni utili per la convalescenza.

Questo tipo di intervento a volte richiede profilassi antitrombotica: è un fluidificante del sangue che riduce il rischio di trombosi; la prima fiala va somministrata la sera prima dell'intervento e le verrà consegnata alla visita di prericovero assieme alle istruzioni per l'autosomministrazione.

Per le cisti di basso sospetto non è prevista la profilassi antibiotica, che invece viene somministrata nel caso di interventi prevedibilmente più complessi per cisti di sospetto intermedio o alto.

A distanza di circa 15 giorni circa dall'intervento arrivano gli esami istologici richiesti con modalità urgente. Se necessita di ulteriori terapie patologico sarà contattata telefonicamente dal personale di reparto per le spiegazioni del caso e per il successivo programma di cura.

A distanza di circa 40-50 giorni dall'intervento arrivano gli esami chiesti con modalità normale: verrà contattata nel caso di patologie che rendano necessarie ulteriori cure. Dovrà ritirare l'esame istologico presso lo sportello "ritiro referti del CUP" dopo 60 giorni successivi dall'intervento.

Alla dimissione le verrà prenotata la visita di controllo da eseguire dopo 30 giorni circa dall'intervento.

Le sarà compilato il certificato per l'astensione dal lavoro

- 3-4 giorni nel caso di cisti di basso sospetto
- 5-7 giorni se l'intervento si è prolungato o complicato
- 3-4 settimane nel caso di intervento per tumore dell'ovaio

Alla luce di quanto letto, Le chiediamo di firmare il seguente consenso:

DICHIARA

- di aver compreso pienamente quanto illustrato
- di esprimere il proprio consenso
- di averne la capacità giuridica
- di essere a conoscenza che tale consenso è univoco, libero da coercizioni, che è revocabile, modulabile per fattori impreveduti che tuttavia si impegna a portare tempestivamente a conoscenza dei Sanitari, assumendosi comunque ogni responsabilità che possa derivare da interruzione o riduzioni del programma terapeutico previsto.
- di essere disposta al massimo livello di collaborazione con il Personale curante e di assistenza, al comune scopo di ottenere il più valido risultato possibile.

Data

Firma Paziente

Firma del Medico

Informativa consegnata in data _____

Da _____ Qualifica _____