

Regione del Veneto

**Azienda ULSS n.7 Pedemontana**

Via del Lotti,n.40

36061 Bassano del Grappa(VI)

Codice fiscale e partita IVA 00913430245

**U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, ospedale di Santorso**

**Direttore dott. Marcello Scollo**



## **NOTE INFORMATIVE PRE INTERVENTO**

### **DIATERMOCOAGULAZIONE DI CONDILOMI**

Sono lesioni di aspetto verrucoso che si sviluppano in seguito al contatto con il virus HPV a trasmissione sessuale. Si trovano sul vestibolo della vagina (l'introito vaginale), in vagina, sul perineo (il tratto di cute tra vagina e ano), attorno all'ano. In caso di fallimento della terapia medica prevista o quando questa non è attuabile se ne consiglia l'asportazione.

L'intervento si svolge in anestesia generale (sedazione) o loco-regionale (spinale) e consiste nell'asportare le lesioni di maggiore volume al fine di averne un esame istologico, e di diatermocoagulare, cioè bruciare, quelle più piccole.

Si conclude con medicazione con pomata antibiotica.

Fino a completa guarigione delle lesioni è raccomandato non fare bagni in piscina, vasca, mare, e avere rapporti sessuali.

#### **Alcune note organizzative sull'intervento:**

Dopo la diagnosi la paziente verrà contattata per fare tutti gli esami preoperatori, e la compilazione della cartella clinica e del consenso informato sia con il ginecologo che con l'anestesista.

Il ricovero sarà diurno.

A distanza di poche ore dalla fine dall'intervento sarà invitata dalle infermiere di reparto a sedersi sul letto, poi a scendere e recarsi al bagno, se non avrà nausea o vomito potrà iniziare a bere e poi ad alimentarsi (thè, fette biscottate, marmellata), nel corso del pomeriggio sarà dimessa.

A casa è invitata a riprendere da subito una vita normale, potrà fare la doccia da subito e alimentarsi come ritiene, meglio se con cibi di facile digestione.

Nei giorni successivi è normale avere delle perdite vaginali di sangue (anche per 15-20 giorni, ma mai con carattere emorragico) e dolore nella sede della sutura, per il quale può assumere l'antidolorifico a cui è più abituata.

Alla dimissione le verranno ripetute e scritte tutte le informazioni utili per la convalescenza.

Questo tipo di intervento non richiede profilassi antitrombotica, e nemmeno antibiotica.

Alla dimissione le sarà compilato il certificato per l'astensione dal lavoro per i 3-4 giorni successivi a quello dell'intervento.

REVISIONATO 31.07.16 Direttore Dott. Marcello Scollo