

Cosa fare dopo la circoncisione?

Al fine di evitare alcune complicanze e di garantire una corretta cicatrizzazione della ferita è necessario:

- Medicare la ferita per 7/10 giorni mattina e sera come segue: pulire la ferita con un disinfettante non alcolico e poi applicare (se prescritta dall' Urologo) la crema antibiotica e coprire con una garza.
- Tenere il pene sollevato verso l'addome per 1 settimana per evitare l'edema.
- I punti di sutura si riassorbono spontaneamente dopo circa 20 giorni dall'intervento.
- Sospendere l'attività sessuale fino a completa caduta dei punti di sutura.
- Evitare sforzi ed attività fisica per 5-6 giorni dopo l'intervento.

Se dovessero presentarsi altri disturbi si rivolga al Medico Curante o telefoni al nostro centro.

DOVE SIAMO

Ospedale Alto Vicentino
via Garziere n. 42 - Santorso (VI)



Scala B Piano 0, Polo Endoscopico

CHI SIAMO

Direttore f.f. Mojtaba Rahmati

Medici

Davide Brotza
Paolo Chierigo
Miriam Fabrello
Maurizio Lazzarotto

Infermiera Coordinatrice Debora Sella

Personale infermieristico

Michele Biasi
Simonetta Cagnotto
Sabina Dalla Costa

Nicoletta Usai
Fiorella Zilio

Personale di supporto

Martina Balasso
Laura Ballico
Maria Dalla Riva
Flavia Finozzi
Sonia Maculan

Marta Pegoraro
Roberta Santacatterina
Agnese Zambon
Milena Zanocco

Personale di Segreteria del Polo Endoscopico

Martina Balasso
Sabina Dalla Costa
Monica Mosele

Milena Zanocco
Fiorella Zilio

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Ospedale Alto Vicentino
Unità Operativa Complessa di **Urologia**

Direttore f.f.: Mojtaba Rahmati

CIRCONCISIONE E PLASTICA DI ALLUNGAMENTO DEL FRENULO

Note informative per il paziente

SEGRETERIA POLO ENDOSCOPICO

dal lunedì al venerdì ore 9 -17

Tel. 0445 571224 Fax 0445 571230

e-mail: endsosa@aulss7.veneto.it


www.aulss7.veneto.it

CIRCONCISIONE E PLASTICA DI ALLUNGAMENTO DEL FRENULO

Che cos'è? Perché viene fatta?

La circoncisione consiste nella rimozione più o meno completa del prepuzio (cute che riveste il glande) ed è indicata qualora sia presente fimosi o una sclerosi del prepuzio.

La fimosi o la sclerosi del prepuzio sono condizioni in cui non si riesce a scoprire il glande in modo agevole e completo.



Cosa fare prima dell'intervento?

In vista dell'intervento è necessario:

- Sospendere l'eventuale terapia con anticoagulanti (Coumadin e affini) in atto sotto il controllo del Medico Curante.
- Sospendere l'eventuale terapia antiaggregante (Aspirinetta, Ticlopidina, Cardirene e affini) almeno 5 giorni prima dell'esame sotto il controllo del Medico Curante.
- Eseguire la mattina dell'intervento una depilazione completa di tutta la zona pubica.
- La mattina dell'intervento fare una colazione leggera.
- Portare le impegnative del Medico Urologo e/o del Medico Curante.
- Portare tutta la documentazione clinica di pertinenza urologica

E' opportuno presentarsi all'appuntamento con accompagnatore.

Come si svolge?

L'intervento di circoncisione si esegue in anestesia locale nell'adulto ed in anestesia generale nel bambino.

L'intervento viene eseguito generalmente ambulatorialmente con il paziente in posizione supina sul lettino operatorio.

Esso consiste in una incisione circolare del prepuzio asportandone la parte più stretta e suturandone i bordi; contestualmente può essere necessaria la plastica di allungamento del frenulo.

Dopo l'intervento, il paziente rimarrà in osservazione per circa 1 ora.

Quali possono essere le complicanze?

La complicanza più comune è l'emorragia, risolvibile nel postoperatorio di solito con la semplice compressione.

Rara è l'infezione.

In qualche caso la fimosi a distanza di tempo può recidivare.