

**PROTOCOLLO APPLICATIVO PROCEDURA DI
 PROFILASSI PER LA PREVENZIONE DELLE NEFROPATIE
 DA MEZZO DI CONTRASTO**

PAZIENTE: Cognome..... Nome.....Data di nascita.....

Medico Prescrittore: Cognome..... Nome.....

MODALITA' PRESCRITTA ESEGUITA

SOSPENSIONE DA ALMENO 24 ORE :

DIURETICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FANS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACE-INIBITORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SARTANO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IDRATAZIONE SOLUZIONE FISIOLÓGICA 1 ml/Kg/h PER INFUSIONE E.V.:

da 12 h prima il MDC ml/ora :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fino 24 h dopo MDC ml/ora :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oppure

IDRATAZIONE CON ACQUA PER OS:

1 Lt nelle 12 h prima del MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Lt. nelle 24 h dopo il MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ALCALINIZZAZIONE BICARBONATO DI Na 1,4% fl.500 ml PER INFUSIONE E.V.:

3 ml/Kg/h nell' h prima il MDC ml/ora :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 ml/Kg/h durante il MDC ml/ora :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 ml/Kg/h nelle 6 h dopo il MDC ml/ora :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oppure

ALCALINIZZAZIONE BICARBONATO DI Na cps 500 mg PER OS :

1 cps ogni 12 h: (1cx2/di) il giorno prima il MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 cps ogni 12 h: (1cx2/di) il giorno del MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 cps ogni 12 h: (1cx2/di) il giorno dopo del MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oppure

ALCALINIZZAZIONE BICARBONATO DI Na POLVERE SOLUBILE PER OS :

5 gr (1 cucchiaino da caffè) ogni 12 h: (1cx2/di) il giorno prima il MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 gr (1 cucchiaino da caffè) ogni 12 h: (1cx2/di) il giorno del MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 gr (1 cucchiaino da caffè) ogni 12 h: (1cx2/di) il giorno dopo del MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACETILCISTEINA - FLUIMUCIL ff 300 mg PER INFUSIONE EV :

Glucosata 5% 100 ml + 2 ff ogni 12 h: (1flac.x2/di) dal giorno prima il MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MDC Glucosata 5% 100 ml + 2 ff ogni 12 h: (1flac.x2/di) il giorno del MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glucosata 5% 100 ml + 2 ff ogni 12 h: (1flac.x2/di) il giorno dopo il MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oppure

ACETILCISTEINA - FLUIMUCIL CPS 600 mg PER OS:

1 cps ogni 12 h: (1cx2/di) il giorno prima il MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 cps ogni 12 h: (1cx2/di) il giorno del MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 cps ogni 12 h: (1cx2/di) il giorno dopo del MDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data

Firma Medico Prescrittore

Firma del Paziente