

	U.O.C. LABORATORIO ANALISI	MOD. D1/D2 RAC SCT
	LABORATORIO ANALISI D1/D2	Rev. n. 0 del 30/05/2023
<b>Modalità esecuzione scotch test</b>		

### INFORMAZIONI

La ricerca degli ossiuri (*Enterobius vermicularis*) va effettuata a livello perianale con lo scotch test o test di Graham.

Il ritiro del kit contenente il vetrino, abbassalingua, astuccio porta-vetrino si effettua presso:

- Segreteria Laboratorio Analisi di Bassano del Grappa (0424 888629):

Lunedì-Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00.

Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

- Punto prelievi Ospedale di Asiago (Portineria 0424 604111):

Lunedì-Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

- Punto prelievi Schio (0445598138):

Lunedì-Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

- Punto prelievi Thiene (0445388198):

Lunedì-Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

### INDICAZIONI ED ISTRUZIONI RACCOLTA

La raccolta va eseguita al momento del risveglio mattutino e prima di lavarsi e di eventuale defecazione.

Utilizzare **nastro adesivo (scotch) trasparente** altrimenti l'esame non potrà essere effettuato.

Vanno eseguiti di norma 3 scotch test preferibilmente a giorni alterni: in caso di positività di uno dei campioni non è più necessario continuare oltre la raccolta.

### ESECUZIONE

1. Proteggere le mani con guanti monouso
2. Tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo trasparente poco più corto del vetrino fornito (7x2 cm circa)
3. Appena svegli al mattino porre il nastro, con la parte adesiva, sulle pliche perianali, comprimere bene sulla pelle sottostante e lasciare adeso per 10 minuti
4. Rimuovere lo scotch ed applicarlo sul vetrino fornito con una leggera pressione evitando la formazione di bolle d'aria
5. Mettere il vetrino con lo scotch nell'astuccio portavetrini
6. Togliersi i guanti e lavarsi bene le mani (le uova sono già embrionate ed infettanti)
7. Consegnare il campione presso uno dei punti prelievo aziendali negli orari previsti

**NOTA:** nel caso risultasse più comodo consegnare in un'unica soluzione tutti e 3 i campioni si raccomanda di conservare i primi 2 in frigorifero per non più di 4 giorni.